

ПРОФИЛАКТИКА ПЕДИКУЛЁЗА

Вшивость возникает при попадании на кожу человека кровососущих паразитов—вшей. На человеке могут паразитировать три вида вшей — головная, платяная, лобковая.

Вши являются переносчиками возбудителей эпидемического сыпного тифа, возвратного тифа, окопной лихорадки.

Передача вшей происходит как при непосредственном соприкосновении с зараженным человеком (нахождение в одной постели, половые - контакты), так и через вещи (постельное, нательное белье, одежду, головные уборы, платки, полотенца, мочалки, расчески).

Дети могут заразиться через игрушки. Головные вши располагаются на волосистой части головы, бровях, бороде, усах. Платяные поселяются в складках и швах белья, откуда переходят на кожу, преимущественно в области шеи и поясицы. Лобковые вши обитают на лобке, половых органах, вокруг заднего прохода и других участках кожи, покрытых волосами. Самки вшей откладывают яйца (гниды), прилепляя их к волосам клейким веществом. Гниды бывают серовато-белого цвета, поэтому они хорошо видны невооруженным глазом. Через 5-6 дней из гнид появляются молодые вши, которые сразу начинают сосать кровь. Укусы вшей вызывают сильный зуд. Это приводит к расчесам, раздражению кожи и развитию гнойничковых заболеваний, что затрудняет распознавание болезни.

При первых признаках заболевания необходимо срочно обратиться к врачу-дерматологу. Самолечение недопустимо. Необходимо знать, что советский закон охраняет врачебную тайну. В настоящее время имеются высокоэффективные средства против вшивости, которая ликвидируется в кратчайший срок при своевременном обращении к врачу. Члены семьи больного обязаны пройти профилактический осмотр у врача. Бельё, одежду, постельные принадлежности необходимо подвергнуть дезобработке или тщательно прокипятить и прогладить утюгом.

НАРУШЕНИЕ ЭТИХ УСЛОВИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВШЕЙ, ЧТО ПОДВЕРГНЕТ ОПАСНОСТИ ЗДОРОВЬЕ БОЛЬШОГО ЧИСЛА ЛЮДЕЙ.